

Chirurgia del Diabete

Mediamente il 20-25% dei pazienti obesi sottoposti a By Pass Gastrico sono pazienti con diabete di II tipo. Orbene, l'88% di questi pazienti guariva dalla malattia e la restante percentuale migliorava drasticamente il controllo della malattia stessa.

Si è pensato pertanto di trasferire questo intervento sui pazienti non francamente obesi (BMI 30-35), ma diabetici di II tipo con difficile controllo della malattia.

In Italia è partito uno studio sperimentale randomizzato, coordinato dall'Università di Genova, a cui partecipano i centri con le maggiori casistiche e dove lo studio sperimentale è stato approvato dal Comitato Etico Aziendale.

L'Azienda Ospedaliera di Desenzano Partecipa a questo studio*.

I criteri di selezione sono:

- Diabete di II tipo da più di 5 anni
- Emoglobina glicata >8
- Assenza di anticorpi anti insula
- C peptide > 1
- BMI >30 e <35

* Gli altri centri che partecipano allo studio:

- Genova – Ospedale S. Martino
- Pisa - P.O. S. Chiara
- Pordenone – A.O. "S. Maria Degli Angeli"
- Sesto S. Giovanni (MI) – IRCSS Multimedica
- Rozzano – IRCSS Istituto Clinico Humanitas
- Genova – E.O. Ospedale Galliera
- Catania – A.O. Garibaldi
- Termoli (CB) – A.S.R. Molise Ospedale S. Timoteo
- Roma – Chirurgia 2 – P.U. "Agostino Gemelli"

